

Большой веретенник *Limosa limosa*. Пять птиц наблюдали 24 июня на обширном мелководье посередине пруда. При первом посещении водоёма веретенников здесь не было.

Озёрная чайка *Larus ridibundus*. Всего в пределах пруда держалось 20-25 особей; из них несколько птиц были на гнёздах, устроенных на обнажившихся песчаных островах. При первом посещении водоёма также наблюдали отдыхавшую на отмели стаю чаек в 80-100 особей.

Сизая чайка *Larus canus*. В разные дни отмечали от 6 до 12 особей. Гнёзд не обнаружено.

Речная крачка *Sterna hirundo*. Небольшая, разбросанная по островам колония (12-15 пар). Видели несколько уже крупных пуховых птенцов.

Л и т е р а т у р а

Сотников В. Н. 2002. *Птицы Кировской области и сопредельных территорий*. Т. 1. Не-воробыиные. Ч. 2. Киров: 1-528.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2016, Том 25, Экспресс-выпуск 1319: 2866-2867

Новый случай залёта полярной совы *Nyctea scandiaca* на Северный Кавказ

Л.Б.Бёме

Второе издание. Первая публикация в 1936*

18 февраля 1936 охотником-осетином (фамилия неизвестна) в ближайших окрестностях селения Ольгинское (Северо-Осетинская автономная область, Северо-Кавказский край) была добыта полярная сова *Nyctea scandiaca*. Добытый экземпляр – взрослая самка в третьем оперении. Сова была совершенно здоровой и в достаточной мере упитанной. Яичник развит для зимы нормально. Размеры птицы следующие: крыло 43.8 см; хвост 29.7 см; плюсна – 7.7 см.

Залёты полярных сов в пределы Северного Кавказа, случаясь чрезвычайно редко, отмечались в литературе и раньше, именно акад. М.А. Мензбир (1895, с. 309) указывает: «самый южный предел зимних странствований белых сов... Тюленьи острова на Каспийском море и Таганрог». К.А.Сатунин (1907, с. 76) пишет, что «в зиму 1902-1903 гг. два или три экземпляра их было добыто в окрестностях города Петровска

* Бёме Л.Б. 1936. Новый случай залёта полярной совы (*Nyctea nyctea* L.) на северный Кавказ // Природа 3: 117.

Даг. области». Автором этой заметки (Бёме 1926, с. 225) указывался случай добычи двух экземпляров полярных сов в ноябре 1898 года в окрестностях ст. Наурской (Северо-Кавказский край, бывшая Терская область). Очевидно, добытый экземпляр полярной совы так далеко за-кочевал на юг в связи с резким похолоданием, наступившим в первой декаде февраля на территории Европейской части ССР.

Л и т е р а т у р а

- Бёме Л.Б. 1926. Птицы Северной Осетии и Ингушии (с прилежащими районами) // *Учён. зап. Сев.-Кавказ. ин-та краевед.* 1: 175-274.
Мензбир М.А. 1895. *Птицы России*. М., 1: I-CXXII, 1-836; 2: I-XV, 837-1120.
Сатунин К.А. 1907. Материалы к познанию птиц Кавказского края // *Зап. Кавказ. отд. ИРГО* 26, 3: 1-144.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2016, Том 25, Экспресс-выпуск 1319: 2867-2868

К распространению и биологии горихвостки-чернушки *Phoenicurus ochruros*

А.Д.Данилович

Второе издание. Первая публикация в 1941*

Широко распространённая в Западной Европе горихвостка-чернушка *Phoenicurus ochruros gibraltariensis* впервые в СССР наблюдалась на гнездовье в Киеве в 1921 году.

С тех пор известны случаи нахождения этой горихвостки и в других местах, что указывает на продолжающееся её расселение (Бурчак-Абрамович, Шепе 1937; следует отметить, что прежние наблюдения о гнездовье горихвостки-чернушки в Киеве не были подкреплены коллекционным материалом). В виду значительного интереса, который представляет вопрос о распространении на восток западноевропейских форм, я привожу новые данные о гнездовании *Phoenicurus ochruros gibraltariensis* в УССР на основании наблюдений, сделанных в течение последних лет.

Горихвостка-чернушка (самец) впервые мне встретилась возле Киева (Голосеевская роща) 26 марта 1924. После этого в моих наблюдениях над чернушкой произошёл перерыв до середины лета 1937 года, когда одного самца я мельком видел в Киеве, в смежных усадьбах домов №№ 36 и 34 по Андреевскому спуску. Там же одна пара чернушек

* Данилович А.Д. 1941. К распространению и биологии горихвостки-чернушки // *Природа* 30, 1: 80.