

сами уступили «первый ряд» гусю. Таким образом, к началу весны поведение гуся изменилось как по отношению к человеку, так и к многочисленным, но более мелким кряквам.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2009, Том 18, Экспресс-выпуск 466: 308-317

Некоторые данные к обзору охотпромыслового состояния Удорского района Коми АССР

А.М.Корсаков

*Второе издание. Первая публикация в 1941**


Удорский район расположен в северо-западной части Автономной республики Коми между $62^{\circ}30'$ и $64^{\circ}40'$ северной широты и $45^{\circ}30'$ и $50^{\circ}35'$ восточной долготы от Гринвича. Граничит: с севера – с Лешуконским районом Архангельской области, с северо-востока – Ижемским, с востока и юго-востока – Усть-Вымским районом Коми АССР, с юга – Ленским, с юго-запада – Верхне-Тойским и с запада и северо-запада – Пинежским районом Архангельской области. Занимает площадь в 3072195.92 га. Общий рельеф холмистый, более возвышенный в северо-восточной части, где проходит Тиманский хребет, имеющий направление с северо-запада на юго-восток. Тиманский хребет в этом месте служит водоразделом между Печорским, Вычегодским и Мезенским бассейнами.

Река Мезень протекает в северо-восточной половине района, беря начало на севере в Тиманском хребте, откуда, идя по восточной части к югу и дойдя до половины района, делает поворот на запад и затем на север, идя параллельно с руслом своего верхнего течения в расстоянии от 25 до 60 км. Река эта имеет очень извилистое течение (повороты её в обратную сторону иногда доходят до 15 км, где она идёт сама от себя в расстоянии 1 км). Такие извилины реки носят название «меч». В верховье Мезень имеет вид горной реки с кряжистым руслом, довольно порожиста и мелководна. В летнее, особенно засушливое время даже на плоскодонных лодках бывает трудно продвигаться по бурливым порогам, имеющим местами значительное протяжение. Пройдя такой порог, обычно попадаешь в довольно глубокое место с тихой водой, напоминающей озеро, носящее здесь название «вега». Ниже по тече-

* Корсаков А. 1941. Некоторые данные к обзору охотпромыслового состояния Удорского района Коми АССР // *Природа и соц. хоз-во* 8, 2: 311-320.

нию, приблизительно от делаемого ею к западу поворота, река Мезень становится шире, протекая от деревни Макорыба по песчаному руслу, и глубина её делается более значительной, но и тут в сильно засушливое лето бывает местами трудно продвигаться в лодках вследствие большого количества переносных песков, образующих многочисленные отмели. Вследствие этого река Мезень бывает судоходна лишь весной и осенью, когда вода поднимается на значительную высоту и пароходы доходят до сёл Глоново и Макорыба. В летнее же время лишь при наличии большого количества выпавших осадков пароходы доходят до села Пыссы и реже до села Кослана.

Административно район разделён на 10 сельсоветов с центром в селе Кослане, расположенном на правом берегу Мезени.



Удорский район Коми АССР

Лесная площадь занимает 99.05% общей площади района. Общая площадь охотничьих угодий занимает 3069954 ю93 га, или 99,86% общей площади района. Промысловая площадь охотугодий, за вычетом из общей площади охотничьих угодий болот, вырубок, гарей, водоёмов, пашен, выгонов, лугов и неудобных земель, как не опромысляемых,— представляет собою 85.28% площади охотугодий и 85.16% общей площади района, занимая пространство, покрытое лесом, площадью в 2617310 га.

Охотпромысловая фауна Удорского района представляется в следующем виде.

Крот *Talpa europaea*, по коми Вурдысь. Распространён в очень небольшом количестве вследствие болотистой почвы.

Медведь *Ursus arctos*, по коми Ош. Довольно многочислен, особенно в северной и юго-восточной, восточной и юго-западной частях района. Добывается в небольшом количестве.

Волк *Canis lupus*, по коми Койн. В районе не распространён, встречаются единичные экземпляры, заходящие из соседних районов на севере реки Печоры и устья реки Мезени и с юго-запада из бывшего Яринского района. Появившийся волк становится непременно добычей охотника.

Песец *Lepus lagopus*, по коми Кынь. Также не распространён и встречается лишь в северной части района; заходит из тундры единично. В 1914 году в северной части района появилось большое количество песцов, распространившихся затем по всему району. Песец этот был проходной: движение его прохода наблюдалось с северо-востока на юго-запад и юг. Держался песец всю зиму.

Лисица *Vulpes vulpes*, по коми Ручь. Распространена в небольшом количестве по всему району.

Барсук *Meles meles*. Охотникам района неизвестен. В 1930 году был случайно добыт один экземпляр на левом берегу реки Елвы в ущелье. Охотник, убивший его, житель села Пыссы Логинов, был удивлён новым невиданным зверем, и никто из охотников не имел понятия, что это за зверь, и только лесовод Б.Ф.Бондин сказал им, что это барсук. По-видимому, в небольшом количестве барсук водится на холмах отрогов Тиманского хребта. Не встречается охотникам вследствие того, что во время промысла на отрогах Тимана барсук уже впадает в спячку, в другое же время года охотники не бывают там. Указанный выше экземпляр барсука добыт ранней весной во время разлива, когда на берегу ещё был снег. Зверь находился на берегу и пил воду, охотник же тихо плыл в лодке по течению и, заметив зверя, выстрелил в него.

Росомаха *Gulo gulo*, по коми Лачег. Распространена по верховьям речек, причём количественно увеличивается к северо-востоку; приносит большой вред охотничьему промыслу, поедая попавшую в ловушки дичь и портя ловушки. Добывается в очень небольшом количестве вследствие отсутствия зверовых лаек, идущих по росомахе.

Лесная куница *Martes martes*, по коми Кунича. Очень многочисленна. За последние годы почти истреблена. Так, в верховьях Мезени по Тиманскому хребту ещё сохранилась куница; но в 1924/25 годах охотники хищнически добывали её, и за указанный сезон 4-5 охотников добыли в среднем по 5-7 штук на человека. После этого ку-

ница, как говорят сами же охотники, исчезла и встречается единично. Добычу куницы необходимо запретить не менее чем на 3 года, а Заготпушнине принять меры к её охране и разведению.

Норка *Mustela lutreola*, по коми Чуш. Распространена по всем речкам.

Горноста́й *Mustela erminea*, по коми Сед-баш. Распространён повсеместно. В 1907 году в северной части района наблюдалось появление большого количества горноста́я, идущего за перекочёвкой зайца; последний был болен какой-то болезнью, и горноста́й, питаясь их трупами и больными, обессиленными, держался продолжительное время и в большом количестве в районе. В 1908 году горноста́й снова появился в районе в большом количестве вслед за перекочевавшей в этот год водяной крысой. За сезон этого года охотники добывали его по 90 и более штук на человека.

Ласка *Mustela nivalis*, по коми Ласича. Распространена повсеместно, но в сравнительно небольшом количестве.

Речная выдра *Lutra lutra*, по коми Вурд. Распространена в верховьях речек в очень незначительном количестве и находится в стадии уничтожения вследствие постоянного преследования её промышленниками из-за высоких цен на шкурку. Добывается круглый год, несмотря на запрещение добывания её. Необходимо принять срочные конкретные меры к её охране, усилив надзор за ней, ведя беспощадную борьбу с браконьерством и разъяснительные беседы с охотниками.

Рысь *Lynx lynx*. Очень немногочисленна, причём увеличивается к югу района.

Заяц-беляк *Lepus timidus*, по коми Коч. Распространён повсеместно. В 1907 году осенью наблюдался мор на зайца при перекочёвке его с севера на юг. Заяц шёл в большом количестве, погибая как от болезни, так и от нападения на слабых, обессиленных, больных зайцев горноста́я, который, передвигаясь за перекочевавшим зайцем, появился в большом количестве в районе.

Летяга *Pteromys volans*, по коми Паля-ур. Встречается в небольшом количестве.

Бурндук *Tamias sibiricus*, по коми Орда. Распространён в очень большом количестве, но добыча его ничтожна, так как не совпадает с сезоном промысла, и охотники считают расценку его шкурки слишком малой, чтобы ходить на его добычу в несезонное время года.

Белка *Sciurus vulgaris*, по коми Ур. Распространена повсеместно и имеет первенствующее значение в охотпромысле. По наблюдениям охотников, появляется в районе в большом количестве через 4 года – в годы урожая еловых шишек. Предвестником появления большого количества белки коми-охотники считают появление также в большом

количестве птичек-клестов, вслед за которыми появляется и белка. Клест, как и белка, питается еловыми шишками, и урожай последних влечёт появление клеста и белки. За последние годы промысел белки пришёл в упадок. Опрос охотников говорит, что белки раньше добывались в урожайные на неё годы по 40-45 штук за день на охотника, теперь же в хороший год 20-25 штук за день, и это уже большая редкость, обычно 10-15 штук, а в среднем на урожайный год – 2-3 шкурки в день. В 1929 году в Пысском сельсовете (северная часть района) наблюдалась перекочёвка белки с весны по осень. Белка в большом количестве шла в направлении с юго-востока на северо-запад. В 1932 году в конце мая и начале июня наблюдалась также в Пысском сельсовете (близ села Пыссы) перекочёвка белки к западу в очень небольшом количестве.

Водяная крыса *Arvicola terrestris*, по коми Вашир. Распространена по всему району, но вследствие дешевизны шкурки промысел не распространён. В 1908 году наблюдалась массовая перекочёвка водяной крысы в направлении к югу.

Лось *Alces alces*, по коми Лола. Распространён в ограниченном количестве в отдалённых от селений лесных массивах. Несмотря на существующее запрещение, лось добывается охотниками.

Северный олень *Rangifer tarandus*, по коми Кор. Распространён в северо-восточной и южной частях района. В северо-восточной части олень водился в большом количестве лет 50-60 тому назад, но затем исчез и появился снова в 1918-1919 годах. В южной же части района (верховья реки Вашки) северный олень появился с 1919 года из стада домашних оленей, прогоняемых с севера в город Яренск. Стада эти разбежались, одичали и путём скрещивания с дикими дали смешанное поколение. Дикий олень, как передают ненцы-оленоводы, во время гона охотно идёт и скрещивается с важенками домашних оленей. Несмотря на запрещение, оленя, как и лося, также добывают охотники, ненцы же добывают самцов-«дикарей» во время рёва, подкарауливая их у стада домашних оленей.

Глухарь *Tetrao urogallus*, по коми самец – Чукчи, самка – Кеней и молодой самец в первую осень – Виер. Довольно многочислен и является основным промысловым видом наряду с рябчиком. Добывается главным образом ловушками, реже ружьём. На заготовку поступает в незначительном количестве. Места гнездовой глухаря и затем нахождение выводков вблизи токовищ в кочковатых болотах с травянистым покровом, с насаждением берёз, сосен и ели, называемом здесь «ольсед»; также по берегам речек с густым покровом трав и порослью берёзы с елью. В таких местах глухарь держится начиная с весны и только в конце осени перебирается на ягодники и затем по всему лесу, придерживаясь сосновых насаждений. Токует в большинстве случаев на

земле и только в местах, более посещаемых человеком,— на деревьях. Весной на токах добывается промышленниками, редко ружьём и то по исчезновении снега, большей же частью петлями, расставленными на снегу.

Тетерев *Lyrurus tetrix*, по коми Тар. Распространён по всему району, но в меньшем количестве, чем глухарь. В 1929 году в верховьях Мезени охотниками было отмечено большое количество тетеревов, но добывали в этот год его мало; весной же на следующий год в то время, как птица села на гнездо, начались сильные заморозки и выпал снег (в Пысском сельсовете снега выпало до 1.5 вершка), яйца помёрзли, и с этого года тетеревов, глухарей и рябчиков стало заметно меньше. Тетерев, так же как и глухарь, добывается ловушками и идёт главным образом на собственное потребление охотников.

Рябчик *Tetrastes bonasia*, по коми Села. Распространён по всему району в большом количестве. Добывается исключительно петлями и поступает на заготовку, идёт также на собственное потребление охотников при отсутствии добычи глухаря или тетерева.

Белая куропатка *Lagopus lagopus*, по коми Байдеч. Встречается в небольшом количестве. Добывается петлями, идёт на заготовку, как и рябчик.

Серый журавль *Grus grus*. Встречается в очень небольшом количестве, обитая в глухих лесных болотах. Не добывается.

Вальдшнеп *Scolopax rusticola*. Точное распространение не выяснено. По сообщению некоторых охотников, встречался ими во время весенней тяги в юго-западной части района в верховьях Вашки.

Дупель *Capella media*. Встречается в очень небольшом количестве во время пролётов.

Бекас *Capella gallinago*. Встречается также на пролётах.

Гусь *Anser* spp., по коми Дзезек. Установить, какие виды обитают в пределах района, не представилось возможным. Распространён в северной части района, в верховьях мелких речек и по глухим лесным болотам. Весной пролётные стаи в большом количестве задерживаются на некоторое время на лесных речках и болотах. Во время же осеннего пролёта задерживаются редко. Добывается ружьём, молодняк же ловится живьём. Идёт на личное потребление.

Кряква *Anas platyrhynchos*, по коми Горда. Распространена по всему району, но сравнительно немногочисленна. Добывается ружьём исключительно для личного потребления, что также относится и ко всем уткам; исключение представляет только синьга, незначительная часть которой идёт на заготовки.

Серая утка *Anas strepera*, по коми Возь. Немногочисленна.

Шилохвость *Anas acuta*, по коми Корег. Встречается в значительно большем количестве.

Чирок-свистунок *Anas crecca*, по коми Зидач. Распространён в большом количестве.

Широконоска *Anas clypeata*, по коми Зук. Встречается в большом количестве во время пролёта.

Гоголь *Fuligula clangula*, по коми Сов-чеж и Сю-чеж. Распространён в очень большом количестве.

Синьга *Fuligula nigra*, по коми Тюксей. Встречается исключительно во время весеннего и осеннего пролётов в очень большом количестве.

Турпан *Fuligula fusca*, по коми Ватор. Встречается во время пролётов.

Крохаль, по коми Косыч. Водится в большом количестве, как *Mergus serrator*, так и *M. merganser*.

Луток *Mergus albellus*, по коми Семзер. Распространён в меньшем количестве, чем чирок, гоголь и крохаль.

Гагары чернозобая *Colymbus arcticus* и краснозобая *C. stellatus*. Распространены по всему району.

Из птиц промысловых, но соприкасающихся с охотничьей фауной, как вредных для охотничьего хозяйства и рыболовства, отметим:

Из хищных и сов: орлан-белохвост *Haliaeetus albicilla*, скопа *Pandion haliaetus*, беркут *Aquila chrysaetos*, сарыч *Buteo vulpinus*, ястреб-тетеревятник *Astur gentilis*, ястреб-перепелятник *Accipiter nisus*, филин *Bubo bubo*.

Из отряда воробьиных: ворон *Corvus corax*, серая ворона *C. cornix*, сорока *Pica pica* и кукушка *Cractes infastus*; последние два вида приносят большой вред промыслу рябчика, расклёвывая тушки попавшихся в петли.

Население района довольно незначительно: на 1 га приходится всего 0.04 человека. По национальности исключительно коми, и только в Пысском сельсовете имеются две семьи, состоящие из 11 ненцев, занимающихся оленеводством.

Из общего числа населения 14329 человек охотников насчитывается 2696 человек, или 79.94% населения мужского пола трудоспособного возраста.

Главное занятие населения – лесозаготовка, а затем сельское хозяйство; на третьем месте стоит охота.

Охотничий промысел начинается с сентября. Охотники уходят в лесную избушку иногда за 150-200 вёрст от дома. Избушки эти расположены по берегам речек. В них охотники живут до середины или конца ноября.

Начинается промысел с боровой дичи, которая ловится расставленными слопами и петлями по тропинкам, идущим в разных направлениях от избушки.

Добыча самоловами зверей и птиц по району (в %)

Названия зверей и птиц	Название самоловов						Всего
	Нальк	Пылем	Капкан	Чоз	Петли на дереве	Петли на земле	
Горноста́й	0.5	90.0	2.0	—	—	—	92.5
Ласка	—	97.0	1.0	—	—	—	98.0
Выдра	—	—	99.8	—	—	—	99.8
Лисица	—	—	100.0	—	—	—	100.0
Заяц-беляк	—	—	99.5	—	—	0.5	100.0
Глухарь	—	—	—	80.0	—	19.0	99.0
Тетерев	—	—	—	90.0	—	9.0	99.0
Рябчик	—	—	—	—	98.0	1.5	99.5
Белая куропатка	—	—	—	—	—	99.0	99.0

Добывание боровой дичи продолжается до выпada снега. В начале октября, смотря по состоянию погоды и выхода белки «на чистую», начинается промысел белки, продолжающийся до выпada глубоких снегов, что бывает в середине – конце ноября. Если белка держится близ береговых избушек, где охотник промышлял дичь, то промысел продолжается близ них; если же белка держится в глубине леса, то промышленник переходит туда, где у него имеются также избушки исключительно для ночёвок во время белкованья.

Расположение тропинок вокруг избушки имеет форму полукруга. Длина каждой тропинки приблизительно 8-10 км с таким расчётом, чтобы охотник мог в день обойти её. Устройство, подготовку и расчистку тропинок необходимо проводить с 10 июня, что и практиковалось раньше, чтобы земля, поднятая в это время, хорошо просохла за лето и птица привыкла бы к этому месту и уже к началу сезона была там. Время, затрачиваемое на подготовку тропинок, в среднем 8 дней. За белкой же промышленник ходит без всяких троп, проходя, смотря по количеству белки, от 15 до 20 км за день, ночуя в избушке или же, если нет избушек, просто под ёлкой, где и живёт с неделю, а затем отправляется на промысел за зайцем или промышляет его близ деревни. Заяц промышляется исключительно капканом. Промысел продолжается до конца декабря, после чего охотник снова уходит в лес на белкованье, продолжающееся до половины марта.

Огнестрельное оружие состоит из разных систем одноствольных дробовых ружей центрального боя и шомпольных, калибров 20-28-32, а также шомпольных и кремневых винтовок калибра 6 мм.

Холодным оружием является нож, по коми пурт, который охотник носит как на промысле, так и дома, на поясном ремне, а затем топор.

Промысловой собакой района является коми лайка, но с большой примесью посторонней крови.

Самыми распространёнными самоловами являются силки, волосянные петли, называемые по коми леч, и слопцы, по коми чоз, употребляемые в большом количестве на боровую дичь. Затем род плашек – нальк и пылем, капканы. Некоторыми охотниками до 1913 года употреблялся на уток перевес – ветос, но теперь он не практикуется.

Чоз применяется в большом количестве и служит орудием лова глухаря и тетерева. Количество чоз на одного охотника колеблется от 20 до 150 штук, в среднем надо считать 40 штук на 1 охотника. Изготовление и постановка занимают 1 день – 6 штук.

Селя-леч – волосянные петли, расставляемые на палках, положенных между двух ёлок на высоте груди человека, с приманкой из пучка ягод (рябина, клюква). Употребляется исключительно для ловли рябчиков. Изготовление занимает: плетение 100 петель – 1 день и расстановка 2 штук – 1 день. В среднем у одного охотника имеется до 150 петель на тропинке.

Муа-леч устанавливается на земле в виде ворот с висящей на перекладине волосяной петлём. Применяется на глухаря, тетерева, также попадает и рябчик. Плетение петель занимает столько же времени, как и селя-сеч; расстановка, вследствие устройства ворот и боковых горбылей и расчистки земли, в 1 день – 12 штук.

Риа-леч (пруток) – то же, что и муа-леч. Разница в том, что верхняя перекладина воротец делается, как у колодца очип, который и настораживается. Попад в петлю, птица срывает сторожок, и очип поднимает её кверху, и она оказывается висящей, отчего сохраняется от порчи мышами или другим зверьком. Применяется очень редко.

Нальк – плашка, ставящаяся около дерева; употребляется для ловли горностая, раньше применялась на рябчика с выдолбленным в виде чашек углублением. Попадшийся рябчик оказывался, таким образом, как бы покрытым, отчего сохранялся от порчи птицей или мышью. Теперь нальк на рябчика не применяется вследствие сравнительно долгой затраты времени на его устройство и вытеснен более простыми петлями селя-леч.

Пылем устраивается под деревом на горностая и в воде на норку. Род плашки, положенной на ребро. Над пылемом устраивается навес из хвойных веток для горностая. Время, затрачиваемое на изготовление, то же, что и чоз. В среднем у одного охотника имеется 20 штук.

Капканы применяются на зайца, норку, горностая, лисицу, выдру и росомаху. На зайцев применяется в большинстве случаев кузнечной работы с подшитым холстом; фабричные бракуются вследствие малого размера тарелочки, отчего заяц проступает ногой мимо тарелочки, и капкан остаётся неспущенным. Необходимо обратить на это внимание при изготовлении капканов также и на лисицу. На норку,

горностая, выдру и росомаху применяются капканы фабричной выделки. В среднем на охотника приходится по 5 капканов, и в них ощущается большой недостаток. Необходимо завоз капканов производить из расчёта в среднем до 30 капканов на охотника.

Все охотники пользуются лыжами исключительно подшитыми; голицы совершенно не применяются.

Браконьерство развито сильно. Во время рыбной ловли или сенокоса бьют и ловят нелётных уток и молодых глухарей. При встрече во всякое время года не упустят убить «дикаря» (северного оленя) и лося, а подчас и далеко отошедшего от чума домашнего оленя. Охотничьего хозяйства до 1933 года в районе фактически не существовало, хотя с октября 1930 имеется охотсовхоз № 4 Севкрайпушнины, который лишь числится на бумаге, работы же никто не вёл, и был лишь проект заготовительного пункта. С 1933 года в верховье реки Мезени организовалась производственно-охотничья станция.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2009, Том 18, Экспресс-выпуск 466: 317-318

О встрече белошапочной овсянки *Emberiza leucocerphala* и корольковой пеночки *Phylloscopus proregulus* на острове Змеиный в Чёрном море

А.И.Корзюков

*Второе издание. Первая публикация в 1982**

На острове Змеиный в Чёрном море (45°15' с.ш., 30°12' в.д.) в 1973-1981 годах автором изучались особенности миграции птиц над акваторией северо-западной части Чёрного моря. В 1973-1975 годах систематически производился сбор птиц, разбившихся о световой маяк и другие маячные сооружения. С 1975 г., кроме того, стали стационарно проводить ночной отлов птиц для кольцевания с помощью света. С осени 1978 г. применили для отлова птиц паутинные сети.

19 октября 1980 на острове Змеиный во время ночных стационарных наблюдений с помощью света (Корзюков 1977) был отловлен молодой самец белошапочной овсянки *Emberiza leucocerphala*. Как отме-

* Корзюков А.И. 1982. О встрече белошапочной овсянки, корольковой пеночки в Северо-Западном Причерноморье // *Вестн. зоол.* 4: 75-76.