

которые придерживались опушек небольших сосновых колков, граничивших со степными сенокосами или некошеной степью. При повторном обследовании этого места 20–21 и 24 мая там отмечен единственный самец юлы, вяло токовавший рано утром 21 мая.

### Литература

- Корнев С.В., Морозов В.В. 2008. Новости и дополнения к фауне птиц Оренбургской области // *Рус. орнитол. журн.* 17 (430): 1091-1099.
- Коршиков Л.В., Корнев С.В. 2000. Дополнительные заметки и комментарии к «Орнитологической фауне Оренбургской области» // *Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири.* Екатеринбург: 118–122.



ISSN 0869-4362

*Русский орнитологический журнал* 2009, Том 18, Экспресс-выпуск 523: 1934-1935

## **Заметки о новых местонахождениях некоторых наземных позвоночных Средней Азии. Aves**

Р.Н.Мекленбурцев

*Второе издание. Первая публикация в 1939\**

*Aquila fasciata* Vieillot, 1822. В 1934 году мною было осмотрено в Чимкентском музее чучело ястребиного орла. Эта птица была добыта Б.П.Тризна в 1912 году в Кара-Тау, вероятно, где-нибудь поблизости от города Туркестана. Ближайшая находка этого орла была сделана Н.А.Зарудным (1911) в 1906 году на Сыр-Дарье у устья Келеса в урочище Ак-Булак. Кроме того, в коллекции кафедры зоологии позвоночных Среднеазиатского государственного университета имеется шкурка *A. fasciata*, добытого Зарудным в 1912 году под Ташкентом.

*Coloeus dauuricus* Pallas, 1776. В коллекции кафедры зоологии позвоночных Среднеазиатского университета хранится один экземпляр даурской галки, добытый Ю.Д.Кашкаровым под Ташкентом 17 ноября 1926 года. До сих пор эта птица наблюдалась в указанном месте только два раза Н.А.Зарудным (1910).

*Uragus sibiricus sibiricus* (Pallas, 1773). Отмечен мною в окрестностях Ташкента 28 декабря 1935. Пара этих птиц, из которой самка была добыта, держалась в небольшой заросли джиды и тамарикса на берегу реки Келес. Ближайшие находки относятся к Восточному Тянь-

---

\* Мекленбурцев Р. 1939. Заметки о новых местонахождениях некоторых наземных позвоночных Средней Азии. *Aves* // *Тр. Узбек. зоол. сада.* Ташкент, 1: 138.

Шаню, откуда длиннохвостый снегирь приводится многими авторами, и к Фергане, где его отмечает Д.Н.Кашкаров (1934).

*Passer domesticus domesticus* (Linnaeus, 1758). Достигает на зимовках не только Ташкента и Андижана, где был отмечен Н.А.Зарудным (1923), но и Маргелана, откуда в коллекции кафедры зоологии позвоночных Среднеазиатского университета имеется один самец, добытый Е.Л.Шестоперовым 27 мая 1910. По всем признакам указанный экземпляр тождественен с воробьями из Джаркента, выделенными Зарудным в особую форму под именем *P. d. semiretschiensis* Zarudny et Kudashev, 1916. Поздняя дата добычи указывает на возможность гнездования этой формы воробья в Фергане.

#### Литература

- Зарудный Н.А. 1910. Заметки по орнитологии Туркестана // *Орнитол. вестн.* 3: 171-178.
- Зарудный Н.А. 1911. Заметки по орнитологии Туркестана // *Орнитол. вестн.* 1: 3-16.
- Зарудный Н.А. 1923. Обзор некоторых воробьёв группы *Passer domesticus* // *Изв. Туркест. отд. Рус. геогр. общ-ва* 16: 52-63.
- Кашкаров Д.Н. 1934. Экологический очерк фауны позвоночных Арсланбоба, Северная Фергана // *Вопросы биологии и биоценологии* 1: 56-114.

