

севернее линии Коробейниково – Марковская Порожня, где её нашёл в 1923 году А.П.Велижанин. В Усть-Чарышской пристани, т.е. немногим севернее Коробейникова, живёт уже *M. alba*, а маскированной трясогузки нет. Сопоставляя факты глубокого проникновения в степь этой птицы к западу от Оби, несколько непонятным оказывается отсутствие её в степи к югу от Чарыша. Обычная по низовьям Чарыша (но не устья, где живёт *M. alba*) с его характерными выходами горных пород, *M. personata* исчезает по направлению к Алтаю и, таким образом, степь по пути от Коробейниково через Калманку новую и старую, реку Кудриху оказывается незанятой этой птицей, но снова она правильно встречается уже в предгорьях Алтая (деревни Огни, Слюдянка, Маралиха и далее), придерживаясь населённых пунктов.

В каком виде рисуется распространение *M. personata* далее на юго-запад, для меня не ясно, но в Саушке и Рубцовке её нет, нет её и под Семипалатинском.

Далее на юг маскированная трясогузка обитает Тарбагатай с Зайсанской котловиной, но насколько проникает она отсюда на северо-запад – неизвестно. По крайней мере, в киргизской степи с горными группами Чингиз-тау, являющейся ветвью Тарбагатай, Коконь и др. вовсе не встречается ни *M. personata*, ни *M. alba*.

Литература

Сушкин П.П. 1914. Птицы Минусинского края, Западного Саяна и Урянхайской земли // *Материалы к познанию фауны и флоры Российской империи*. Отд. зоол. **13**: 1-551.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2007, Том 16, Экспресс-выпуск **371**: 1057-1059

Интересные находки в окрестностях Семипалатинска

В.А.Селевин

*Второе издание. Первая публикация в 1927**

Ведя орнитологические сборы в окрестностях города Семипалатинска, мне удалось за последние годы сделать несколько интересных находок, о которых считаю небесполезным поделиться на страницах журнала «Uragus».

* Селевин В. 1927. Интересные находки в окр. гор. Семипалатинска // *Uragus* 1: 8-9.

Erithacus rubecula. Экземпляр этой типичной европейской птички пойман 14 декабря 1924. Зорянка была одна и находилась на Полковничьем острове вблизи Семипалатинска недели две или три, прежде чем была поймана. Насколько мне известно, это первый фактически доказанный случай залёта малиновки в пределы губернии. Есть основание полагать, что этот вид изредка залетает в окрестности Семипалатинска, хотя птиц больше не добыто, но они наблюдались на растоянии А.Н.Белослюдовым. Описываемый экземпляр послан мною Б.К.Штегману (Академия наук). До сих пор нахождение этого вида было в Сибири, насколько знаю, известно лишь для Томска (28 августа 1920 нов. ст.). Акад. П.П.Сушкин (1925) приводит его для Кобдо.

Spermolegus atrogularis. Одинокое державшийся на Собачьем острове на Иртыше у самого Семипалатинска экземпляр черногорлой завирушки, встречающейся у нас в Западном Алтае и его предгорьях (окрестности Усть-Каменогорска), пойман 4 декабря 1923. Птичка жила у меня в клетке около года. Для проверки определения тушка птички мною послана Б.К.Штегману. Для окрестностей Семипалатинска и уезда до сих пор черногорлая завирушка не была отмечена.

Chloris chloris. Поймана полная одиночка самка на Полковничьем острове под Семипалатинском 11 февраля 1925, где зеленушка держалась почти всю зиму. Экземпляр мною подарен доктору А.П.Велижанину (Барнаул). Судя по размерам и окраске, этот экземпляр относится, по-видимому, к типичной европейской форме, залёт которой возможен в наши края. Орнитолог П.М.Залесский, которому я показывал шкурку, склонен признать экземпляр принадлежащим к этой форме, хотя окончательное определение подвида нами временно оставлено за отсутствием сравнительного материала. Если не ошибаюсь, мой экземпляр является второй находкой зеленушки в Сибири (единственный факт добычи 27 августа 1891 известен мне для Томска – *Вестн. Томск. орнитол. общ-ва им. С.А.Бурутлина*, 1921) и первой птицей, добытой в Семипалатинской губернии.

Carpodacus roseus. Массовый залёт розовых чечевиц имел место в конце зимы 1922 года. Начиная с половины февраля, большое количество этих птиц держалось по улицам Семипалатинска, совместно с вьюрками *Fringilla montifringilla*. Исчезли птицы в конце марта. В окрестностях города не были замечены. Попали сюда розовые чечевицы, несомненно, из предгорий Западного Алтая, куда они спускаются зимою, доходя до Усть-Каменогорска. Кочуя по долине Иртыша, они добрались и до Семипалатинска, где раньше этого не были замечены. Для Семипалатинского уезда приводится мною также впервые. Пойманные мною в 1922 году розовые чечевицы прожили у меня в клетке около 3 лет. В декабре 1925 г. взрослая особь этого вида снова поймана

на Полковничьем острове в клетке в кружке «Любителей природы» (при Гоголевской библиотеке).

Rallus aquaticus. 30 мая 1925 я имел возможность отметить единственный случай залёта водяного пастушка под Семипалатинск. Птица, летевшая вечером над городом в темноте, ударилась о проволоку телефонной сети и, повредив немного крыло, упала на землю. Оправившись, она забежала через сломанное окно в квартиру слесаря. Здесь она прожила более недели у хозяев, которые кормили её крошками и тараканами. Скоро птичка куда-то исчезла.

Литература

Сушкин П.П. 1925. *Список и распределение птиц Русского Алтая и ближайших частей Северо-Западной Монголии, с описанием новых или малоизвестных форм*. Л.: 1-79.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2007, Том 16, Экспресс-выпуск 371: 1059

О весенних перемещениях кольчатой горлицы *Streptopelia decaocto* над островом Змеиный в Чёрном море

А.И.Корзюков

Второе издание. Первая публикация в 1984*

В 1974-1982 годах пролёт одиночек и реже небольших стаяк (4-12 птиц) кольчатых горлиц *Streptopelia decaocto* отмечался на острове Змеиный (северо-западная часть Чёрного моря) с конца марта – начала апреля (23 марта 1979) до конца мая (1977). Масса отловленных в апреле-мае горлиц ($n = 11$) – от 128.2 до 235.0, в среднем 193.3 г.



* Корзюков А.И. 1984. О весенних перемещениях кольчатой горлицы над островом Змеиный // *Орнитология* 19: 202.