

К вопросу о распространении колючехвостого стрижа *Chaetura caudacuta caudacuta*

В.Н.Скалон

Второе издание. Первая публикация в 1927*

Ввиду значительного интереса, который представляет вопрос распространения на запад восточносибирских форм, мне кажется не лишним опубликовать факт нахождения мной колючехвостого стрижа *Chaetura caudacuta caudacuta* (Latham, 1801) в Нарымском крае, обобщив при этом те данные о его распространении в Западной Сибири, которые удалось собрать.

Во время поездки в Нарымский край летом 1927 года в первый раз встретились колючехвостые стрижи 21 июля, около деревни Усть-Чулым, при впадении Чулыма в Обь.

День был пасмурный, то и дело начинал моросить дождь. В количестве нескольких штук летали стрижи около 19 ч над невысоким, но обрывистым берегом, покрытым редкими кустами тальника. Вблизи была деревня, в отдалении сплошная урёма. Ни высоких строений, ни больших деревьев поблизости не было.

Вторично встретились они вечером 22 июля 1927, верстах в 5 ниже деревни Петровой Колпашевского района. Вечер был тихий и ясный, солнце почти село. Первый стриж пронёсся над неподвижной гладью Оби и улетел к низменному левому берегу. Несколько ниже, где старая высокая тополёвая роща покрывает правый берег реки, над водой начали реять несколько стрижей. Они вылетали откуда-то из рощи, носились над рекой то посередине, то подаваясь к видневшемуся вдали левому берегу и большой дугой возвращаясь назад.

Пустив лодку по течению, я выждал, когда стриж налетел близко, выстрелил, но промахнулся, т.к. птица нырнула в воздухе. Тотчас от берега кинулось к лодке ещё два стрижа (всего их было штук семь). После того, как один был подстрелен, все остальные немедленно исчезли с плёса, скрывшись в направлении правого берега.

Упавший стриж оказался старой самкой и был необычайно живуч: одна дробина переломила ему крыло, другая попала в грудь, пробив, как оказалось потом, *crista sterni*. Тем не менее он долго умирал, сопротивляясь сдавливавшей его грудь руке. Желудок, зоб и пищевод птицы были сплошь набиты мелкими насекомыми, главным образом,

* Скалон В.Н. 1927. К вопросу о распространении *Chaetura caudacuta caudacuta* (Lath.) в Западной Сибири // *Uragus* 4: 13-15.

если не исключительно, представителями отряда двукрылых Diptera.

Больше в Нарымском крае я колючехвостых стрижей не наблюдал. Однако утром 14 августа 1927 д-р Ганс Хр. Иогансен на лугах левого берега Оби, против села Колпашево, видел стайку из 6 колючехвостов, быстро пролетевших, играя высоко в воздухе, в направлении на юго-запад.

В 1921 году, во время экспедиции на Обь-Енисейский канал, В.Я.Башутин (личное сообщение) на реке Кети добыл экземпляр колючехвостого стрижа около юрты Мулешкиных, там, по его словам, 17 сентября в 12 ч наблюдалась стайка около 20 экз. День был пасмурный, дождливый, и стрижи летели над самой водой. В.Я.Башутин стрелял в них три раза и на третий раз попал в быстро летевшего стрижа, который упал на отмель противоположного берега.

Около месяца перед тем, в районе самого Обь-Енисейского канала, он наблюдал стаю каких-то стрижей, но не считает возможным решительно признать в них колючехвостов.

Хотя наличие в этих местах колючехвостого стрижа и не может считаться чем-либо необыкновенным, но, в подтверждение этой возможности, беру на себя смелость сообщить, что в небольшой орнитологической коллекции Красноярской ихтиологической экспедиции 1927 года я видел экземпляр колючехвостого стрижа, добытый одним из сотрудников экспедиции в районе Обь-Енисейского канала.

Особо интересными являются наблюдения В.Я.Башутина (личное сообщение), произведённые им летом 1927 года в верховьях Вас'югана, где он провёл два лета как сотрудник колонизационно-переселенческой партии.

26 июля 1927 на Чертале, левом притоке Вас'югана, близ устья речки Айсас, около 15 ч при ясной погоде колючехвостые стрижи летали над рекой в количестве 12 штук. Низменные берега реки в этом месте заросли старым смешанным лесом. 14 августа на той же Чертале, около юрт Верхне-Зырянских, верстах в 60 от устья, около 15 ч при пасмурной погоде высоко над рекой летало их не менее 18 штук. В.Я.Башутин стрелял в них два раза, но, к сожалению, неудачно. На месте наблюдения берега Черталы низменны. Левый берег покрыт старым смешанным лесом, правый представляет чистое, топкое болото. Последнее наблюдение относится к реке Вас'юган. 30 сентября около юрт Грабцевых в полдень при совершенно ясной погоде над рекой летало их не менее 10 штук. Вас'юган в этом месте имеет высокие крутые берега, покрытые лесом и рямом.

К сожалению, В.Я.Башутину не удалось добыть ни одного экземпляра, но т.к. эти птицы ему хорошо известны и все три раза он мог подолгу наблюдать их в бинокль, достоверность этих сведений для меня не подлежит сомнению.

В единственной орнитологической работе, посвящённой Нарымскому краю (Аникин 1902), представляющей список из 98 видов птиц из окрестностей г. Нарыма, сведений о колючехвостом стриже мы не находим.

Относительно нахождения колючехвостого стрижа в других местностях Западной Сибири мы располагаем следующими данными.

В 1915 году 9 июня на Чулыме между юрт Чердатских и Колпаковских эту птицу наблюдал с парохода проф. Г.Э.Иоганзен (1921).

На реке Яе (приток Чулыма) с 11 июня по 25 августа 1917 Т.Э.Сольский добыл 7 экз. колючехвостых стрижей и там же 2 июля 1918 ещё пару (Иоганзен 1921).

На основании этих наблюдений П.М.Залесский (1921) приводит эту птицу в своём списке Томских пернатых.

По словам П.А.Шастовского (личное сообщение), летом 1927 года один охотник добыл колючехвоста на 19-й версте Томской ж.-д. ветки. Сам он добыл 2 самцов около станции Тайга 15 июля 1927, а также наблюдал их там, летавших около ж.-д. водокачки на реке Яе.

Старая большая колония колючехвостых стрижей имеется в скалах на реке Томи близ ст. Поломошная, где впервые он был добыт Горчаковским, и другая колония в том же районе на реке Писаной.

Летом 1926 года гр. Соловкин добыл пару колючехвостов близ станции Анжерка. Птицы были привезены в Томск для препаровки, но ввиду жаркого времени успели так разложиться, что препаровка их не представлялась возможной.

Все изложенные данные свидетельствуют, что распространение на запад колючехвостого стрижа идёт развёрнутым фронтом и что не только «р. Чулым с притоком Яей являются путём, которым колючехвостый стриж проникает» в Западную Сибирь, как пишет Г.Э.Иоганзен (1921), но и река Кеть, и лесные и лесостепные пространства средней Сибири.

Нельзя не отметить также, что это «распространение», возможно, является во многих случаях просто результатом крайне малой исследованности орнитофауны нашего края, допускающей до сих пор возможность того, что относительно редкие птицы остаются совсем не замеченными, а потому дальнейшие сведения о движении *Chaetura caudacuta* на Запад и Север представят тем более значительный интерес.

Л и т е р а т у р а

- Аникин В.П. 1902. Отчёт о командировке в Нарымский край летом 1900 года // Изв. Томск. Ун-та 22: 1-121.
- Залесский П.И. Предварительный перечень птиц нижнего течения р. Томи // Вестн. Томск. орнитол. общ-ва 1: 149-189.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2007, Том 16, Экспресс-выпуск 390: 1623-1626

Зимовка птиц на севере Новой Земли

В.Т.Бутьев

*Второе издание. Первая публикация в 1959**

До недавнего времени существовало мнение, что суровый климат служит препятствием для зимовки птиц в Арктике. Однако климатические и ледовые условия севера Новой Земли (76° с.ш.) отличаются от других арктических территорий, расположенных примерно в тех же широтах. Это связано с близостью сравнительно тёплого в зимний период Баренцева моря, с наличием вдоль западного и северного берегов острова тёплого течения и, наконец, с частым прохождением циклонов, сопровождающихся сильными ветрами и оттепелями. Вследствие этого зима на севере Новой Земли умеренно холодная: средняя температура самого холодного месяца (марта) – минус 22°C. Сильные ветры и течения не позволяют образовываться у берегов устойчивому ледовому покрову. Поэтому в течение всей зимы здесь встречаются вблизи берега участки чистой воды (размером от нескольких квадратных метров до квадратных километров).

Наличие открытой воды, богатой мелкими морскими животными, создаёт благоприятные условия для зимовки чистиковых птиц, которые являются доминирующей группой в орнитофауне северо-востока Новой Земли. Питаясь беспозвоночными и рыбой, они прекрасно приспособились к существованию на далеком Севере. Поэтому решающим фактором, обеспечивающим зимнее обитание таких видов, как чистик, кайра, люрик, является не климат, а возможность добывания корма на чистой воде.

Впервые на северо-востоке Новой Земли, в районе мыса Константина, зимующих птиц обнаружил В.М.Антипин (1938). Он отметил три вида: атлантического чистика, короткоклювую кайру и люрика.

С 8 сентября 1955 по 15 марта 1957 мы проводили в районе мыса Желания географические исследования, в которые входило изучение орнитофауны, при этом удалось получить некоторые сведения по зимовке чистиковых птиц, а также белой чайки и морянки.

* Бутьев В.Т. 1959. Зимовка птиц на севере Новой Земли // *Орнитология* 2: 99-101.