

- Cramp S., Perrins C.M., Brooks D.J. 1994. *Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa. The Birds of the Western Palearctic. Vol.VIII. Crows to Finches*. Oxford Univ. Press.: 1-899.
- Cramp S., Simmons K.E.L. 1983. *Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa. The Birds of the Western Palearctic. Vol.III. Waders to Gulls*. Oxford Univ. Press.: 1-913.
- Frieswijk J.J. 1977. Black-headed gulls foot-paddling on grassland // *Brit. Birds* **70**, 6: 266.
- Goodwin D. 1976. *Crows of the World*. London: 1-354.
- King B. 1976. Further records of foot-paddling by gulls on grassland // *Brit. Birds* **69**, 5: 180-181.
- Tinbergen N. 1962. Foot-paddling in gulls // *Brit. Birds* **55**, 3: 117-120.
- Vernon J.D.R. 1972. Feeding habitats and food of the black-headed and common gulls. Part 2. Food // *Bird Study* **19**, 4: 173-186.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2007, Том 16, Экспресс-выпуск 366: 898-899

Зарянка *Erithacus rubecula* в Тобольском районе

М.П.Тарунин

Второе издание. Первая публикация в 1927*

О нахождении зарянки *Erithacus rubecula* в Западной Сибири имеются следующие указания: В.Н.Плотникова в окрестностях посёлка Ямышевский на Иртыше, П.М.Залесского в окрестностях Томска и В.Селевина в окрестностях Семипалатинска; но кроме этого о нахождении зарянки в окрестностях Тобольска и Тюмени было сообщено А.М.Лапиным ещё в 1907 г. в его работе «Орнитологические коллекции Тобольского Губернского Музея». Но сообщение В.Н.Плотникова вызвало сомнение, а на работу А.М.Лапина никто, кажется, не обратил внимания. На стр. 27 своей работы А.М.Лапин указывает на две шкурки: одна добыта им в деревне Соколовка близ Тобольска 6 мая 1906 ст. ст., причём имеется приписка: «приходилось видеть часто»; другая добыта Д.Я.Вардроппером в дер. Чёрная Речка близ Тюмени 18 апреля 1901 ст. ст. Шкурки этих экземпляров до сих пор хранятся в Музее Тобольского Севера.

Мною добыто в окрестностях Тобольска три экземпляра зарянки, два старых самца и один неперелинявший ещё молодой, а из наблюдений удалось выяснить, что зарянка — обыкновенная, гнездящаяся

* Тарунин М. 1927. *Erithacus rubecula* (L.) в Тобольском районе // *Uragus* 4: 18-19.

здесь птичка. Прилетает к нам очень рано. Первую песенку её уже можно слышать в конце апреля. В начале мая, в числах десятых их уже появляется много. Гнезда зарянки мне пока не удалось найти, но зарянок я наблюдал каждое лето и несколько раз встречал молодых, ещё плохо летающих. Отлёт зарянок происходит в середине сентября, во время которого они встречаются в самых ближайших окрестностях и иногда в самом городе. В это время они встречаются в стайках пеночек и горихвосток *Phoenicurus phoenicurus*, а иногда и в стаях вьюрков *Fringilla montifringilla*.

Любимые места зарянок после прилёта – это берёзовые леса, сильно разреженные, с очень густым подлеском. Особенно охотно они держатся в глубоких оврагах, на дне которых у ручья есть заросли ольхи и черёмушника, а склоны поросли редким высоким березняком. Такие места у нас встречаются в Загородной и бывшей Архиерейской рощах и в окрестностях деревни Соколовка в 15 верстах от Тобольска. Вскоре же по пролёте, ранним утром, ещё в сумерках, самцы начинают петь, перелетая по верхушкам высоких берёз. Вечерами после заката солнца самцы снова поют, но уже в густой чаще. Днём я ни разу не слышал пения зарянки.

О нахождении зарянок в Тобольском районе в данное время сомнения быть не может, ибо все орнитологические коллекции Музея, а также и мои собственные просмотрены и проверены проф. П.П.Сушкиным.

