

К биологии чекана-плясуна *Oenanthe isabellina*

М.Д.Зверев

Второе издание. Первая публикация в 1927*

Во время работ по изучению биологии сусликов в Минусинском округе в 1927 году мне пришлось ежедневно наблюдать чеканов-плясунов *Oenanthe isabellina*, живущих в близком соседстве с сусликами. В литературе образ жизни этих птичек освещён очень мало, между тем он весьма интересен.


Чеканы-плясуны в Абаканской степи появляются весной очень рано. 15 апреля, в день приезда на место работ, это были одни из наиболее часто встречающихся птичек в поле. В хорошую погоду с утра до вечера раздавалось пение самцов, подобно скворцам *Sturnus vulgaris* искусно вставляющих в свою песенку то чистый крик перепела, то ржание жеребёнка или блеяние овцы и ряд других звуков. Иногда самцы взлетают во время пения на воздух и, распустив хвост, планируют на землю громко распевая. Местные жители зовут чеканов «барашками» или «пересмешниками».

В степях Минусинского и Хакасского округов чеканов можно найти всюду, где встречаются норы сусликов. В норах они проводят ночь, спасаются от непогоды, хищных птиц, выводят и выкармливают птенцов. Занимая норы сусликов, чеканы выплачивают трудолюбивым зверькам свой долг бдительной охраной всего участка. Стоит только показаться поблизости человеку, хищной птице или собаке, как чеканы начинают издавать громкое тревожное «чоканье», очень похожее на крик сусликов Эверсмана *Citellus evermanni* Brandt, 1841 [*Spermophilus undulatus* Pallas, 1779]. Услышав крики птичек, суслики встают на задние лапки, тревожно озираются и завидя опасность, бегут к своим норкам.

Заняв какую-нибудь норку для своего гнезда, парочка чеканов не подпускает к ней других птичек и сусликов. Стоит зверьку приблизиться слишком близко к такой норе, как он подвергается нападению чекана. С громким чоканьем, распустив хвост, птичка бросается на суслика и, не долетев до него на несколько сантиметров, поднимается вверх, чтобы тотчас напасть снова и снова. Суслик при каждом налёте отступает, пока, наконец, не обращается в бегство или скрывается в ближайшей норе. Чекан некоторое время бегаёт около норы, раскинув веером хвост и опустив крылья, а затем улетаёт к своему гнезду. Когда

* Зверев М.Д. 1927. К биологии чекана-плясуна (*Oenanthe isabellina* Cretschmer) // *Uragus* 4: 7-9.

чекан преследует суслика, то иногда кажется, что птичка как бы сидит на нём, размахивая крыльями, отчего местные жители иногда называют чеканов «наездниками»*.



Разрез норы суслика Эверсмanna с гнездом чекана-плясуна.

Гнездо чекана помещается недалеко от входа в норку (см. рисунок). Нередко гнездо даже видно и его можно достать рукой. Из 7 осмотренных гнёзд самое глубокое помещалось в 135 см от входа. Материалом для гнезда служат корешки и стебли растений, клочья шерсти, пух и прочее. Все осмотренные норки с гнёздами чеканов имели наглухо забитый землёй ход дальше за гнездом. Вероятно, птички выбирают для устройства своих гнёзд брошенные норки, в которых зимовали суслики. Впадая осенью в спячку, суслики делают недалеко от входа земляную пробку, чтобы холод не проникал в нору. Весной суслики обычно выходят из норы не старым ходом, а роют новый выход, который они начинают делать ещё с осени, но не доводят до поверхности земли. Такими норками, очевидно, только и пользуются чеканы для устройства своих гнёзд. Профессор П.П.Сушкин (1914, с. 376) пишет: «...иногда роет норы и сам (чекан-плясун – М.З.); у некоторых птиц весной перья у основания клюва вытерты и клюв имеет вид, как у старого грача». Нам ни разу не приходилось наблюдать чеканов, роющих норки. Скорее можно предположить, что чеканам приходится иногда заделывать землёй ходы норок дальше за гнездом, если они не находят подходящих норок.

Спаривание и кладка у чеканов происходит вскоре же по прилёте. Выкармливают птенчиков самец и самка различными насекомыми. У маленьких птенчиков испражнения бывают после того, как появится взрослая птичка и даст им в рот пищу. Проглотив корм, птенчик тотчас же начинает пятиться на край гнезда, махая хвостиком, и выпус-

* Жители села Монах Минусинского округа уверяли меня, что не раз видели, как чеканы садились на сусликов и ехали некоторое время на них, но мне не приходилось быть очевидцем таких случаев.

кает свои жидкие экскременты, заключённые в тонкую плотную плёнку. Взрослая птичка подхватывает клювом этот пузырёк и вылетает с ним из гнезда. Таким образом в гнезде поддерживается чистота.

Первые лётные птенцы были замечены 10 мая, но, вероятно, это был ненормально ранний выводок, т.к. массовое появление молодых лётных чеканов отмечено лишь в конце мая и в начале июня. Первое время молодые чеканы, уже хорошо летающие, при приближении к ним человека прятались в норки, вместо того чтобы улетать. Многие из них в это время делались добычей деревенских детей, которые вытаскивали птичек из нор, быстро запуская туда руку, или выливали одним или двумя котелками воды. В 20-х числах июня вспугнутые молодые чеканы стали отлетать, а не прятаться в норки.

Главная масса чеканов-плясунов, гнездящихся в Абаканской степи, улетает во второй половине августа. Одиночки и стайки в несколько штук наблюдались до 18 сентября.

Литература

Сушкин П.П. 1914. Птицы Минусинского края, Западного Саяна и Урянхайской земли // *Материалы к познанию фауны и флоры Российской империи*. Отд. зоол. **13**: 1-551.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2011, Том 20, Экспресс-выпуск **662**: 1114-1116

Гнездование кольчатой горлицы *Streptopelia decaocto* в Артёмовске (Донецкая область)

М.П.Ильях

*Второе издание. Первая публикация в 1997**

Артёмовск – типичный небольшой город, районный центр в Донецкой области с населением около 100 тыс. жителей. Он расположен на реке Бахмутке, имеет хорошо развитую промышленность и является крупным железнодорожным узлом. Кольчатая горлица *Streptopelia decaocto* давно заселила Артёмовск и в настоящее время она – многочисленный гнездящийся оседлый вид города.

Наблюдения проведены в 1990-1992 годах. Яйца измеряли штангенциркулем с точностью до 0.1 мм. Объём яиц вычисляли по формуле: $V = 0.51L \times B^2$, где V – объём (см³), L – длина (см), B – ширина (см).

* Ильях М.П. 1997. Гнездование кольчатой горлицы в г. Артёмовске Донецкой области // *Кавказ. орнитол. вестн.* **9**: 38-39.